

国際交流委員会より

★重要：NANDA-I 推奨のアセスメント枠組み

アセスメント枠組みには「NANDA-I 分類法 II の 13 領域」を使うべきか、それとも「機能的健康パターンの 11 パターン」にすべきか、といった混乱への朗報です。NANDA-I が推奨する看護アセスメント（データ・ベース）枠組みはゴードンの「機能的健康パターン」であることが、「定義と分類 2009-2010」で明記される予定です。

そもそも NANDA-I 分類法 II の 13 領域は、看護診断を分類する、体系的に位置づける目的で開発された枠組みです。NANDA-I としては、アセスメント枠組みとしての活用は意図していません。NANDA-I では現在「診断倍増計画」を推進中です。看護診断の増加に伴って、13 領域の分類枠組が変わる可能性があります。現在、13 領域をアセスメント枠組みに使用している施設では、NANDA-I 分類法が変更となっても、日常業務に支障のないように、早めに対応を検討しておくことをお勧めします。

NANDA-I 分類委員会担当理事 Gunn von Krogh 氏が分類法 II の抱える構造上の問題点を以下の論文で指摘しています。An examination of the NANDA International taxonomy for domain completeness, ontological homogeneity, and clinical functionality. International Journal of Nursing Terminology and Classifications, 19(2), 65-75, 2008.

NANDA-I 2009-2010 看護診断情報

新たに追加された看護診断

- (1) Risk for Disturbed Maternal Fetal Dyad
- (2) Self Neglect
- (3) Risk for Shock
- (4) Risk for Ineffective Renal Perfusion
- (5) Ineffective Peripheral Tissue Perfusion
- (6) Risk for Ineffective Cerebral Tissue Perfusion
- (7) Risk for Decreased Cardiac Tissue Perfusion
- (8) Risk for Ineffective Gastrointestinal Perfusion
- (9) Risk for Dysfunctional Gastrointestinal Motility
- (10) Dysfunctional Gastrointestinal Motility
- (11) Risk for Vascular Trauma
- (12) Risk for Electrolyte Imbalance
- (13) Readiness for Enhanced Childbearing Process (日本発看護診断第 1 号)
- (14) Neonatal Jaundice
- (15) Risk for Bleeding
- (16) Ineffective Activity Planning
- (17) Impaired Comfort

- (18) Impaired Individual Resilience
- (19) Readiness for Enhanced Resilience
- (20) Risk for Compromised Resilience
- (21) Readiness for Enhanced Relationship (日本発看護診断第2号)

修正された看護診断

- (1) Ineffective Self Health Management (ラベルの変更: 旧 Ineffective Therapeutic Regimen Management 非効果的治療計画管理)
- (2) Risk for Imbalanced Fluid Volume
- (3) Defensive Coping
- (4) Chronic Low Self Esteem
- (5) Disturbed Personal Identity
- (6) Disturbed Sleep Pattern (復活)
- (7) Risk Prone Health Behavior
- (8) Risk for Impaired Liver Function